

Додаток 2
до Порядку організації надання
перинатальної та неонатальної
допомоги
(пункт 2 розділу VI)

**Перелік медичних показань для надання медичної допомоги
на третьому рівні перинатальної мережі**

1. Жінки з акушерським ускладненнями, зокрема:
 - тяжка прееклампсія;
 - еклампсія;
 - вагінальні кровотечі у II та III триместрі вагітності або після пологів (за відсутності показань до невідкладного розродження або після надання необхідної невідкладної медичної допомоги та стабілізації стану);
 - передчасне відшарування нормально розташованої плаценти (за відсутності показань до невідкладного розродження та/або після надання необхідної невідкладної медичної допомоги та стабілізації стану);
 - передлежання плаценти;
 - передчасні пологи в термінах від 22 до 33 повних тижнів;
 - плацентарна недостатність із критичним станом плода;
 - передчасний розрив плодових оболонок у терміні 22-33 повних тижнів;
 - тяжка анемія;
 - багатоплідна вагітність з ускладненнями (TTTS, загибель одного плода);
 - два та більше кесарських розтинів в анамнезі;
 - заплановані вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці.

2. Жінки з тяжкою екстрагенітальною патологією:
 - артеріальна гіпертензія II-III ступеня із ураженням органів – мішеней;
 - серцево – судинні захворювання зі значним порушенням гемодинаміки та розвитком серцевої недостатності II – III ступеня (функціональний клас за NYHA III-IV);
 - тяжкі ураження нирок з порушенням функції (нефропатія, ниркова недостатність);
 - тяжкі захворювання печінки;
 - ендокринні захворювання (цукровий діабет з ускладненнями, у тому числі гестаційний інсулінозалежний, порушеннями функції відповідної залози);
 - захворювання системи зсідання крові;
 - автоімунні та системні захворювання (системний червоний вовчак, антифосфоліпідний синдром);
 - онкологічна патологія;
 - неврологічна патологія;
 - легеневі захворювання, ускладнені дихальною недостатністю;
 - гінекологічна патологія.

3. Стани плода:
затримка росту плода II – III ступеня;
вроджені вади розвитку плода, що потребують антенатального та/або постнатального хірургічного втручання;
водянка плода;
діагностовані внутрішньоутробні інфекції.

4. Стани новонародженого:
гестаційний вік <32 тижнів;
маса тіла при народженні < 1500 г;
вроджені вади розвитку та стани, що потребують хірургічного втручання та/або інтенсивної терапії;
гіпоксично-ішемічна енцефалопатія з поліорганним ураженням;
потреба лікувальної гіпотермії;
інші тяжкі ураження центральної нервової системи;
судоми, резистентні до стандартної терапії;
дихальні розлади, які потребують респіраторної підтримки;
неонатальні інфекції із септичними ознаками;
клінічно маніфестний геморагічний синдром, небезпечна жовтяниця, потреба обмінного переливання крові;
метаболічні порушення, резистентні до стандартної терапії;
відсутність позитивної динаміки або погіршення стану новонародженого незважаючи на лікування у ЗОЗ першого та другого рівнів перинатальної мережі протягом 48-72 годин;
стани, які потребують виконання спеціальних діагностичних процедур або оперативного втручання;
потреба будь-яких діагностичних та/або лікувальних заходів, недоступних у ЗОЗ першого та другого рівнів перинатальної мережі.
