







Рентгенологічні зміни





Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)



Your Health ▾

Community, Work & School ▾

Healthcare Workers & Labs ▾

Health Depts ▾

Cases & Data ▾

More ▾

🏠 Healthcare Workers

HEALTHCARE WORKERS

Testing

+

Clinical Care

–

Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19)



MICHIGAN MEDICINE
UNIVERSITY OF MICHIGAN

INPATIENT GUIDANCE FOR TREATMENT OF COVID-19 IN ADULTS AND CHILDREN

[Health Topics ▾](#)[Countries ▾](#)[Newsroom ▾](#)[Emergencies ▾](#)[Data ▾](#)[About Us ▾](#)[Home](#) / [Emergencies](#) / [Diseases](#) / [Coronavirus disease \(COVID-19\)](#) / [Technical guidance](#) / [Case management](#)

Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Patient management

[← Coronavirus disease \(COVID-19\)](#)[← Technical guidance](#)[Case management](#)

To view all of WHO's country and technical guidance on COVID-19 please visit our publications hub

[Access the publications hub →](#)

COVID-19 is an emerging, rapidly evolving situation.

Get the latest public health information from CDC: <https://www.coronavirus.gov>

Get the latest research information from NIH: <https://www.nih.gov/coronavirus>

[COVID-19 Treatment Guidelines](#)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines

[VIEW GUIDELINES](#)

Credit NIAID-RML



**Handbook of COVID-19 Prevention
and Treatment**



Infectious Diseases Society of America Guideli

[← View all Guidelines](#)



Get the Guidelines App!



Abstract

Executive Summary and Background

Methods and Search Results

Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19

Published by IDSA on 4/11/2020. Last updated, 9/4/2020

Download



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ

Наказ МОЗ України від 31.12.2020р. №3094



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2020

N 3094

м. Київ

Статус: Чинний

Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Відповідно до статті 14¹ Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України від 30 березня 2020 року № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на підставі протоколу засідання робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) від 24 грудня 2020 року № 17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України від 02 квітня 2020 року № 762
(в редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України
від «31» грудня 2020 року №3094)

ПРОТОКОЛ

**«НАДАВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»**

НАКАЗУЮ:



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

СТАНДАРТ

Наказ МОЗ України від 07.01.2021р. №10

Статус: Чинний



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.01.2021

№ 10

м. Київ

**Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги
«Коронавірусна хвороба (COVID-19)»**



COVID-19.

Відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 квітня 2020 року № 555-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30 листопада 2020 року № 2764 «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2020 року за № 1228/35511, підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015



COVID-19.



Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2020

N 3094

м. Київ

Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Відповідно до статті 14¹ Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України від 30 березня 2020 року № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на підставі протоколу засідання робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) від 24 грудня 2020 року № 17

НАКАЗУЮ:

Підтверджений
COVID-19:
середній ступінь
тяжкості

Амбулаторне лікування:

- 1) надати пацієнту інформацію щодо повноцінного харчування та відповідної регідратації;
- 2) симптоматичне лікування із застосуванням жарознижуючих засобів (парацетамол, ібупрофен тощо) при лихоманці та болю.

Застереження: парацетамол приймати не більше 1 г на прийом і не більше 3 г на добу. Уникати використання високих доз ібупрофену (≥ 2400 мг на добу) у пацієнтів із неконтрольованою артеріальною гіпертензією, застійною серцевою недостатністю (II–III функціональний клас за критеріями NYHA), діагностованою ішемічною хворобою серця, захворюванням периферичних артерій та/або цереброваскулярними захворюваннями, хронічною хворобою нирок III–V стадій. При застосуванні ібупрофену в низьких дозах (до 1200 мг на добу) не спостерігається збільшення ризику серцево-судинних тромботичних подій;

- 3) не використовуйте кортикостероїди для лікування COVID-19 у пацієнтів, які не потребують кисневої підтримки;
- 4) протимікробні засоби протипоказані та призначаються виключно за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або при обґрунтованій підозрі на неї;
- 5) при утрудненні дихання рекомендовано перебувати в положенні «лежачи на животі», оскільки це допомагає розкрити альвеоли, що спалися, та підвищити рівень кисню

COVID-19.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2020

N 3094

м. Київ

Статус: Чинний

Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Відповідно до статті 14¹ Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України від 30 березня 2020 року № 539-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на підставі протоколу засідання робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) від 24 грудня 2020 року № 17

НАКАЗУЮ:

Підтверджений
COVID-19:

1) оптимальна підтримуюча терапія в лікарняній палаті (або відділенні/палаті інтенсивної терапії);

10

тяжкий перебіг
захворювання

≥1 з наступного:
частота дихання
≥30/хв (дорослі);
≥40/хв
(діти <5).

Насичення
киснем крові
≤92%;
співвідношення
 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$.
Інфільтрати в
легенях >50%
легеневого поля
частота дихання
≥30/хв (дорослі);
≥40/хв
(діти <5).

Насичення
киснем крові
≤93-94%;
співвідношення
 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300$.
Інфільтрати в
легенях >50%
легеневого поля

2) киснева підтримка;

3) системні кортикостероїди перорально або внутрішньовенно. Може застосовуватися дексаметазон або інші кортикостероїди, такі як гідрокортизон, метилпреднізолон.

Доза дексаметазону 6 мг один раз/добу є еквівалентною (з точки зору глюкокортикоїдного ефекту) 32 мг метилпреднізолону (8 мг кожні 6 годин або 16 мг кожні 12 годин) або 150 мг гідрокортизону (50 мг кожні 8 годин).

Тривалість лікування до 7–10 днів (або до виписки із закладу охорони здоров'я, якщо це відбудеться раніше).

Застереження: контролюйте рівень глюкози, незалежно від того, чи відомо, що у пацієнта цукровий діабет;

4) призначення низькомолекулярних гепаринів (НМГ), якщо це не протипоказано (детальніше – див. пункт 2 частини III);

5) за умови приєднання бактеріальної флори ретельно розгляньте застосування протимікробних або протигрибкових засобів відповідно до локальної епідеміології (детальніше – див. пункт 4 частини III).

Варіанти додаткової терапії (за клінічними показаннями):

1) розгляньте ремдесивір

Science News

from research organizations

Too many COVID-19 patients get unneeded 'just in case' antibiotics

Date: August 27, 2020

Source: Michigan Medicine - University of Michigan

Summary: A study in 38 Michigan hospitals shows need for faster in-hospital testing for coronavirus and other infections, which could reduce overuse of antibiotics that raise risks to patients.

Share: [f](#) [t](#) [p](#) [in](#) [✉](#)

RELATED TOPICS

Health & Medicine

- › [Today's Healthcare](#)
- › [Wounds and Healing](#)
- › [Infectious Diseases](#)
- › [Patient Education and Counseling](#)

FULL STORY

More than half of patients hospitalized with suspected COVID-19 in Michigan during the state's peak months received antibiotics soon after they arrive, just in case they had a bacterial infection in addition to the virus, a new study shows. But testing soon showed that 96.5% of them only had the coronavirus, which antibiotics don't affect.

USA

Понад 50% пацієнтів з підозрою на COVID-19 отримували АБП

У 96,5% з них виділили лише SARS-CoV-2 (на який антибіотики не діють!!!)

- 38 госпіталів

- понад 1700 хворих